

*2018年2月改訂

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面及びビンラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないこと


ちくのう症 副鼻腔炎 | チクナイン[®]_b

販売名: チクナイン_b

漢方製剤 第2類医薬品

製品特徴

- ちくのう症(副鼻腔炎)、慢性鼻炎を改善する内服薬です
- 9種類の生薬からなる漢方「シンイセイハイトウ辛夷清肺湯」の働きで、
鼻の奥の炎症を鎮めながら、うみ膿を抑えて呼吸を楽にします
- 1日2回で効く錠剤です



⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸虚弱で冷え症の人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------|
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

| 症状の名称 | 症 状 |
|----------|---|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる |
| 腸間膜静脈硬化症 | 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる |

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

*4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うものの次の諸症：
鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症（副鼻腔炎）

用法・用量

次の量を朝夕、食前又は食間に水又はお湯で服用してください

| 年齢 | 1回量 | 服用回数 |
|-----------|-----------|------|
| 大人（15才以上） | 4錠 | 1日2回 |
| 7才以上15才未満 | 3錠 | |
| 5才以上 7才未満 | 2錠 | |
| 5才未満 | × 服用しないこと | |

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること
 - (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- 食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

成分・分量

1日量（8錠）中
辛夷清肺湯エキス・・・2.0g

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| シンイ …… 1.5g | チモ …… 1.5g | ビャクゴウ …… 1.5g |
| オウゴン …… 1.5g | サンシシ …… 0.75g | バクモンドウ …… 3.0g |
| セッコウ …… 3.0g | ショウマ …… 0.75g | ビワヨウ …… 0.5g |
| より抽出 | | |

添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、トウモロコシデンプン含有する

- 本剤は天然物（生薬）を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと
- (5) ビンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先（お客様相談室）
0120-5884-01
9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3
10169903 MADE IN JAPAN