

使用前にこの箱の説明文書を必ず
お読み下さい。また、必要な時に
読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痛消炎薬 第2類医薬品 7枚入
ロキソニンEXテープ(7枚×1袋)

特
徴

すぐれた鎮痛消炎効果をもつ[ロキソプロフェンナトリウム水和物]を8.1%配合。

さらに2つの有効成分を追加配合。

つらい痛みの芯まで直接浸透してしっかり効く。



使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります)

1.次の人は使用しないで下さい。

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたこと
がある人

(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用し
てせんそくを起こしたことがある人 (3)15歳未満の小児

2.次の部位には使用しないで下さい。

(1)目の周囲、粘膜等 (2)しつしん、かぶれ、傷口
(3)みずむし・たむし等又は化膿している部位

3.本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないで下さい。

4.連続して2週間以上使用しないで下さい。(本剤は痛みを一時的
におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用
を中止し、医師の診療を受けて下さい)

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

(1)医師の治療を受けている人

(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(3)妊娠又は妊娠していると思われる人 (4)高齢者

(5)次の診断を受けた人 気管支ぜんそく

効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首
の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付して下さい。

[用法・用量に関連する注意]

(1)用法・用量を厳守して下さい。

(2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、
痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ
使用して下さい。

(3)1日あたり4枚を超えて使用しないで下さい。

(4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとてから使用して下さい。

(5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の
小片を自安として半日以上貼り、発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等の症状
が起きないことを確かめてから使用して下さい。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。

(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ
替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)

(4)品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋のチャック
をきちんと閉めて保管して下さい。(5)表示の使用期限を過ぎた
製品は使用しないで下さい。また、アルミ袋を開封した後は、なる
べく早く使用して下さい。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があります
ので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、 水疱、青あざができる、色素沈着
消 化 器	胃部不快感、みぞおちの痛み
そ の 他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は
直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、 声のかけられ、くしゃみ、のどのかゆみ、 息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような 症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この 外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 下痢、軟便	この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
4.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、 この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。 (他の疾患の可能性があります)	この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

成分・分量(膏体100g中)

成 分	分 量	はたらき
ロキソプロフェン ナトリウム水和物	8.10g (無水物として7.14g)	炎症や痛みのもと [プロスタ グランジン] をおさえます。
トコフェロール酢酸 エステル	2.3g	患部の血行を促進し、痛みを やわらげます。
l-メントール	3.5g	清涼感を与え、痛みをやわらげます。
添加物: スチレン・イソブレン・スチレンブロックポリマー、ボリソング レン、水添ロジングリセリンエスティル、BHT、ステアリン酸亜鉛、流動パラ フィン、その他3成分	[1枚あたり(7cm×10cm) 膏体量0.7g]	本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。 第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室 〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10 電話 0120-337-336 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

02®登録商標

第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

リードケミカル株式会社

富山県富山市日俣77-3

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

MADE IN JAPAN



4 987107 631985